

**MG-lääkkeet ja hoito**

Mestinon

Ubretid

Efedrin

Muut

Kortisoni

Atsatiopriini

Tymektomia: Ei ole tehty

On tehty

päivämäärä:

**Muut sairaudet ja lääkitys**

**Tietoa**

**myasthenia gravis-sairaudesta**

MG on autoimmuunisairaus, jossa tahdonalaisten lihasten hermo-lihasliitoksen toiminta on häiriintynyt. Siitä seuraa lihasten vaihtelevanasteinen heikkous ja väsyvyys, joka pahenee rasituksessa ja lievittyy levossa.

**Useat lääkkeet pahentavat sairauden oireita, mm:** morfiini, tubokurariini, penisillamiini, kiniini, bentsodiatsepiinit, barbituraatit, fentiatsiinit, klorokiini, magnesium.

**Myasteeninen kriisi:** Kun potilas ei kykene nielemään lääkkeitä, anna neostigmiiniä 1–2 mg i.m.

Huom! **Kolinerginen kriisi** (lääkityksen yliannostus) aiheuttaa myös lihasheikkoutta.

Helsinki 18.3.2001 Kiti Müller, LKT,  
neurologian erikoislääkäri

**Hoidostani vastaavat**

Sairaala

Puhelin

Lääkäri

Lääkärin puhelin

---

**Lähiomainen tai yhteyshenkilö**

Puhelin

Osoite



**-potilaskortti**

Tämän kortin omistajalla on  
**Myasthenia gravis-sairaus (MG)**

---

Nimi

---

Henkilötunnus

---

Osoite

---

Puhelin

---

Suomen MG-yhdistys ry  
PL 187 00101 HELSINKI

---

<http://www.suomenmg-yhdistys.fi>  
[toimisto@suomenmg-yhdistys.fi](mailto:toimisto@suomenmg-yhdistys.fi)