

Tratamiento y medicación de Miastenia grave

Inhibidores de la anticolinesterasa

Mestinon

Ubretid

Efedrin

Otros

Corticoides

Azatioprina

Timectomía: No

Si fecha:

Otras enfermedades y su medicación

Información sobre la enfermedad de Miastenia grave

La miastenia grave es una enfermedad autoinmune, en la cual la función de los transmisores neuromusculares están dañados. Por esta razón el paciente tiene una tendencia a la fatiga y a una debilidad progresiva de los músculos voluntarios después de su continua utilización. El reposo mejora los síntomas.

Varios fármacos empeoran los síntomas de la enfermedad, *entre otros*: La morfina, la penisilamina, la quinina, los barbitúricos, el magnesio, la clorokina, el tubocurare.

En caso de Crisis miástenica: cuando el paciente no sea capaz de tragar medicamento, dar de 1–2 mg i.m. de neostigmina.

Observación Una sobredosis de medicación produce una **Crisis kolinérgica**.

*Helsinki 18.3. 2001 Kiti Müller, M.D.
Ph.D., Expert of Neurology*

Responde de mi tratamiento

Nombre del Hospital

Teléfono

Nombre doctor

Teléfono doctor

Nombre de la Persona de contacto o familiar

Dirección

Teléfono



-Tarjeta

Informativa del paciente

El dueño de esta tarjeta tiene la enfermedad: Miastenia grave (MG)

Myasthenia Gravis

Nombre

Número de identificación

Dirección

Teléfono

Asociación finesa de Miastenia Grave
Suomen MG-yhdistys ry
Box 187 00101 HELSINKI
FINLAND
<http://www.suomenmg-yhdistys.fi>
toimisto@suomenmg-yhdistys.fi